

**CARGO**

Tacna, 14 JUL 2014

OFICIO MÚLTIPLE N° 001 - 2014-DGP-DRSET/GOB.REG.TACNA

SEÑOR(A)(ITA):

DIRECTOR(A) DE LA UGEL TACNA, TARATA, CANDARAVE Y JORGE BASADRE.

Presente.-

ASUNTO : REMITO INFORMACIÓN PARA DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN

REFERENCIA : OFICIO MÚLTIPLE N° 47-2014-MINEDU/VMGP-DIECA



Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y a la vez remitir adjunto copia del oficio de la referencia con las **recomendaciones necesarias para evitar la transmisión de la fiebre Chikungunya**, en vista de que existe el riesgo de su introducción y propagación en nuestro país. En tal sentido será importante socializar y difundir las recomendaciones dadas por la Dirección de Educación Comunitaria y Ambiental del MINEDU, en las instituciones educativas de nuestra jurisdicción como medida de prevención.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para reiterarle mis consideraciones de aprecio y estima personal.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

Prof. **FREDDY EDINSON JIMÉNEZ PAREDES**  
DIRECTOR DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

RECEIVED  
14 JUL 2014  
Recibido por: [Signature] Hora: 12:00h



PERÚ

Ministerio  
de Educación

Viceministerio de  
Gestión Pedagógica

Dirección de Educación  
Comunitaria y Ambiental

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 – 2016"

## INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES ANTE VIAJES A PAÍSES CON TRANSMISIÓN DE FIEBRE CHIKUNGUNYA

### ➤ ¿Qué es la fiebre chikungunya y cómo se transmite?

- ✓ Es una enfermedad viral transmitida al ser humano por la picadura de zancudos infectados con el virus Chikungunya.
- ✓ Los zancudos que pueden transmitir la enfermedad son el *Aedes aegypti* y el *Aedes Albopictus*, especies que también pueden transmitir el dengue. Estos zancudos suelen picar durante todo el día, aunque su actividad puede ser mayor al principio de la mañana y al final de la tarde.

### ➤ ¿Cuáles son los síntomas de la fiebre chikungunya?

- ✓ El síntoma más común es la aparición repentina de fiebre, a menudo acompañada de dolor en las articulaciones.
- ✓ Otros síntomas incluyen escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas, conjuntivitis, fatiga, rash (erupción cutánea), etc.
- ✓ Los síntomas comienzan generalmente de 4 a 8 días después de la picadura del mosquito, pero pueden aparecer desde el día 2 hasta el día 12.

### ➤ ¿Cuáles son los países donde existe transmisión de la fiebre chikungunya?

- ✓ En América son los siguientes: República Dominicana, Haití, Puerto Rico, Guayana Francesa, Martinica, Guadalupe, San Martín (territorio francés), San Bartolomé, Dominica, San Martín (territorio holandsés), San Vicente y las Granadinas, Anguila, Santa Lucía, San Cristóbal y Nevis, Islas Vírgenes Británicas, Guyana, Antigua y Barbuda, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes (USA).
- ✓ También existe transmisión de la enfermedad en algunos países de África y Asia.

### ➤ ¿Cuándo podemos sospechar si una persona tiene fiebre chikungunya?

- ✓ Cuando el paciente tiene los signos y síntomas antes descritos y ha estado en algún país o región con transmisión de la enfermedad.

### ➤ ¿Qué hacer ante la sospecha de un caso de fiebre chikungunya?

- ✓ Al primer síntoma acudir o comunicarse con el establecimiento de salud más cercano.
- ✓ Es importante seguir las indicaciones médicas. No automedicarse.



PERÚ

Ministerio  
de Educación

Viceministerio de  
Gestión Pedagógica

Dirección de Educación  
Comunitaria y Ambiental

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"  
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 – 2016"

➤ **¿Cuál es el tratamiento para la fiebre chikungunya?**

- ✓ El tratamiento consiste principalmente en aliviar los síntomas, entre ellos el dolor.
- ✓ La enfermedad carece de tratamiento específico y no hay vacuna contra el virus.

➤ **¿Cuáles son las medidas de prevención si las personas realizan un viaje a un país con transmisión de fiebre chikungunya?**

- ✓ Evitar exponerse a zonas donde abunden los zancudos, así como usar repelentes, ropa que cubra las extremidades y mosquiteros.
- ✓ Durante la permanencia en el país con transmisión, al presentar uno o más síntomas de los antes mencionados, avisar inmediatamente al servicio de salud.
- ✓ Si al retorno al Perú se presenta uno o más síntomas antes descritos, acudir o comunicar al establecimiento de salud más cercano, haciendo mención del viaje realizado. El paciente deberá mantenerse en su domicilio durante el tiempo que indique el personal de salud, para evitar la diseminación de la enfermedad.
- ✓ Brindar en todo momento las facilidades al personal de salud.